

## ОТЧЕТ

### об апробации гемостатического средства Гемоблок

Гемостатический препарат «Гемоблок» показал свою эффективность при его клиническом применении:

1) в условиях амбулаторного гинекологического приема в женской консультации больницы №2 (г.Волжский)

Средство применялось при выполнении 30 кольпоскопий с забором биопсийного материала. При этом на месте биопсийного дефекта шейки матки осуществлялась экспозиция салфетки, смоченной Гемоблоком в течении 30 секунд, добиваясь полной остановки кровотечения. Использование данного гемостатического средства позволило устранить необходимость применения электрокоагуляции, вызывающей необратимые постожоговые изменения тканей шейки матки в области забора биоптата.

2) в условиях стационарного приема в Военном окружном госпитале:

- при выполнении 10 холецистэктомий средство Гемоблок использовалось для остановки кровотечения их ложа желчного пузыря. Временная экспозиция салфетки смоченной средством Гемоблок сопровождалась остановкой кровотечения в течение 1 минуты.

- при остановки носового кровотечения возникшего как следствие основного заболевания: пневмония, гипертонический криз. При этом необходимо отметить случай носового кровотечения в следствии эндотоксикоза, развившегося на фоне пневмонии, не останавливающегося типичными способами, включая тампонаду. Остановка кровотечения была достигнута в течении 1 минуты при использовании задней тампонады материалом, смоченным средством Гемоблок.

- при выполнении резекции почки с остановкой паренхиматозного кровотечения средство Гемоблок использовалось путем смачивания и экспозиции салфетки в течение 2 минут.

3) в отделении челюстно-лицевой хирургии Волгоградской областной клинической больницы:

- Гемоблок применен при выполнении операций по поводу перелома нижней челюсти, пластики дефектов местными тканями, лоскутных пародонтальных операциях. Средство применялось путем экспозиции в течении 30 секунд – 1 минуты на тканях дна операционной раны смоченной им салфетки.

4) Хирургическое отделение клиники стоматологии ВолгГМУ:

- Средство Гемоблок применялось для остановки кровотечения из лунки при сложном удалении ретинированного 8 зуба. Остановка кровотечения достигалась в течении 2 минут после тампонирования лунки турундой, смоченной Гемоблоком.

5) Городская клиническая больница №1, отделение челюстно-лицевой хирургии, центр лечения врожденных аномалий челюстно-лицевой области:

- средство Гемоблок применялось для остановки кровотечения во время 5 операций при пластике дефектов верхней губы и неба. Временная экспозиция салфетки смоченной средством Гемоблок сопровождалось остановкой кровотечения в течение 1 минуты.

- средство Гемоблок применялось для остановки кровотечения во время 11 первичных хирургических обработках ран лица. Временная экспозиция салфетки смоченной средством Гемоблок сопровождалось остановкой кровотечения в течение 1 минуты.

Заведующий кафедрой медицины  
катастроф ГБОУ ВПО «Волгоградский  
государственный медицинский университет»  
Минздрава РФ, доктор медицинских наук, доцент

С.В.Поройский